

BAREM CORECTOR VARIANTA NR. I



Subiectul 1 (total 50 PCT)

Hemoptizia – Conduita de urgenta:

- Repaus absolut, in pozitie semisezanda, in camera bine aerisita. – **5 PCT.**
- Repaus vocal absolut, va vorbi in soapta, doar prin simpla miscare a buzelor sau prin semne facute cu gesturi minime. – **5 PCT.**
- Se recomanda respiratia pe nas, lenta si profunda. – **5 PCT.**
- Se da bolnavului sa bea lichide reci in cantitati mici si repetate. – **5 PCT.**
- Se aplica punga cu gheata pe regiunea sternala sau asupra zonei presupus sangeranda, ca si pe zona genitala (testicule sau vulva – reflex vaso-constrictor). – **5 PCT.**
- Bolnavul va fi cat mai putin posibil perturbat de cei din jur, cu examinari minime (puls, T.A., temperatura). - **5 PCT.**
- In hemoptiziile abundente (stenoză mitrală) se poate face legatura celor 4 membre (alternativ) pentru a diminua intoarcerea venoasa (20-30 minute). Se poate face de mai multe ori in cursul zilei. Dezlegarea se va face progresiv, lent si alternativ, pentru a nu mari brusc intoarcerea sangelui la inima. – **5 PCT.**
- Se combate tusea cu codenal (2-3 tablete o data) dionina sau calmotusin (10-12 picatur, se pot administra la 2 ore interval). – **5 PCT.**
- Asistenta medicala pregateste medicatia si o administreaza la recomandarea medicului. – **5 PCT.**
- Spitalizarea este necesara in toate cazurile de hemoptizii medii si mari, precum si in cele in care diagnosticul etiologic nu este precizat. – **5 PCT.**



Subiectul 2 (total 25 PCT)

Nevoia de a respira si a avea o buna circulatie – Obstructia cailor respiratorii, Interventiile autonome ale asistentei:

- Pacientul sa respire liber, pe nas: **(5 PCT)**
 - la nivelul nasului
 - indeparteaza secretiile nazale
 - umezeste aerul din incapere
 - asigura un aport suficient de lichide pe 24 de ore
- Pacientul sa nu devina sursa de infectie: **(5 PCT)**
 - educa pacientul pentru a folosi batista individuala, de unica folosinta
 - educa pacientul pentru a evita imprastierea secretiilor nazale
- Pacientul sa fie echilibrat psihic: **(5 PCT)**
 - pregateste psihic pacientul, in vederea aplicarii tehnicilor de ingrijire si in vederea aspirarii secretiilor nazale
 - asigura pozitie antalgica
 - invata pacientul sa utilizeze tehnici de relaxare
 - pregateste psihic pacientul, in vederea oricarei tehnici la care va fi supus (punctii, examene radiologice, endoscopice)
- Pacientul sa prezinte rezistenta crescuta fata de infectie: **(5 PCT)**
 - invata pacientul sa evite schimbarile bruste de temperatura si de asemenea, aglomeratiile
- Pacientul prezinta cai respiratorii permeabile si o buna respiratie : **(5 PCT)**



- la nivelul plamanului si bronhiilor
- invata pacientul sa tuseasca, sa expectoreze si sa colecteze sputa
- umezeste aerul din incapere cu apa alcoolizata
- aspira secretiile bronsice, daca este cazul
- invata pacientul sa faca gimnastica respiratorie
- asigura pozitia sezand sau semisezand a pacientilor cu dispnee
- invata pacientul sa renunte la obiceiurile daunatoare (fumat)
- administreaza tratamentul prescris : antitusive, expectorante, bronhodilatatoare, decongestionante ale mucoasei traheo-bronsice

Subiectul 3 (total 25 PCT)

In unitate se folosesc biocide tip 1 si 2. Enumerati pentru ce sunt utilizate biocidele tip 1 si 2.

- Definitie – **5 PCT**
- Utilizare – **20 PCT**

